



Guía para el bienestar de los adultos

Dar prioridad a la atención médica preventiva



Salud para adultos: Personas mayores de 18 años

La atención médica preventiva es muy importante para los adultos. Al tomar buenas decisiones básicas sobre su salud, tanto mujeres como hombres pueden mejorar su salud y bienestar. Estas son algunas decisiones que influyen su salud positivamente:

- alimentarse sanamente;
- hacer ejercicio regularmente;
- no fumar;
- limitar el consumo de alcohol;
- procurar tener un peso saludable.

Pruebas de prevención	
Peso	Cada consulta o al menos anualmente
Índice de masa corporal (BMI, en inglés)	Cada consulta o al menos anualmente
Presión arterial (BP, en inglés)	Cada consulta o al menos anualmente
Colesterol	Los adultos entre 40 y 75 años, o los adultos entre 20 y 39 años si tienen un riesgo mayor de padecer enfermedad coronaria, deben hacerse la prueba de colesterol. Consulte a su profesional médico para saber cuándo iniciar y con qué frecuencia debe hacerse esta prueba.
Prueba de detección de cáncer de colon	Se puede detectar el cáncer colorrectal en adultos de 45 a 75 años mediante una de las siguientes pruebas: • prueba de sangre oculta en las heces con guayacol (gFOBT) cada año; • prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año; • prueba inmunoquímica fecal (FIT) en ADN cada 1 a 3 años; • sigmoidoscopia flexible cada 5 años; • sigmoidoscopia flexible cada 10 años con la prueba FIT anualmente; • colonoscopia cada 10 años; • colonografía por tomografía computarizada cada 5 años.** Los riesgos y las ventajas de las diferentes pruebas de detección varían. Para obtener información detallada sobre sus beneficios farmacéuticos, llame al número en su tarjeta de asegurado.
Prueba de detección de diabetes	Las personas con presión arterial alta deben hacerse la prueba. Las personas con sobrepeso o factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares deben hacerse la prueba. Todas las demás personas deben hacerse la prueba a partir de los 45 años.**
Prueba de detección de Hepatitis C (HCV, en inglés)	Los adultos entre 18 y 79 años deben hacerse esta prueba una vez. La mayoría de los adultos solo necesita hacerse la prueba solo una vez. Las personas con un riesgo continuo de contraer infecciones del virus de la Hepatitis C (HCV, en inglés) (por ejemplo, las personas que se inyectan drogas) y las personas con un riesgo elevado de infección deben hacerse la prueba periódicamente.
Prueba de detección de VIH	Los adultos entre 18 y 65 años, los adultos de edad avanzada con riesgo elevado y las embarazadas deben hacerse esta prueba. Aquellos entre 26 y 45 años deben consultar sus opciones con su profesional médico.

* Un prestador de servicios médicos puede ser un médico, profesional médico principal, asistente médico, enfermero profesional u otro profesional de la salud.

** Las recomendaciones pueden variar. Consulte a su profesional médico para saber cuándo iniciar y con qué frecuencia debe realizarse las pruebas de prevención, especialmente si sus riesgos son mayores.

Salud para adultos

Se exhorta a hombres y mujeres a buscar atención médica según sea necesario, tomar decisiones informadas y dar prioridad a hacerse las pruebas médicas regularmente. Esto incluye llevar un estilo de vida saludable y obtener los servicios de atención médica preventiva recomendados. Además, si se sigue un plan para mejorar la salud general, es más probable lograr un mayor bienestar.

Además de los servicios que se mencionan en la sección *Salud para adultos*, también es importante hablar con su profesional médico sobre las recomendaciones que se incluyen en la tabla a la derecha.

Vacunas	
Tétanos, difteria y tos ferina (Td/Tdap)	Administrarse la vacuna Tdap una vez, luego, un refuerzo de Td cada 10 años
Influenza (gripe)	Anualmente
Virus del papiloma humano (HPV, en inglés)	Adultos entre 18 y 26 años: de 2 a 3 dosis dependiendo de la edad cuando recibieron la vacuna inicial y si todavía no las ha recibido.** Aquellos entre 27 y 45 años deben hablar con un profesional médico sobre sus opciones.
Herpes Zóster (culebrilla)	2 dosis de RZV a partir de los 50 años o 1 dosis de ZVL a partir de los 60 años. Consulte las opciones con su profesional médico.*
Varicela (<i>Chicken Pox</i>)	2 dosis (si nació en 1980 o en un año posterior)
Neumococo (pulmonía)	Mayores de 65 años: 1 dosis de PCV 13 y 1 dosis de PCV 23, al menos, un año después de recibir la dosis PCV 13.**
Sarampión, paperas, rubéola (MMR, en inglés)	1 o 2 dosis para los adultos nacidos a partir de 1957 que no tienen evidencia de inmunidad
Vacuna contra COVID-19	Los CDC recomiendan que los adultos se vacunen contra COVID-19. Hable con su profesional médico o farmacéutico sobre la vacuna contra COVID-19 y cuándo debería recibirla.
Recomendaciones para la mujer	
Mamografía	Mujeres entre 50 y 74 años: deben hacerse una mamografía, al menos, cada 2 años. Mujeres entre 40 y 49 años: deberían hablar sobre los riesgos y las ventajas de la prueba con su profesional médico.
Prueba de detección de cáncer cervical	Mujeres entre 21 y 65 años: Prueba de Papanicolaou al menos cada 3 años Otra opción para mujeres entre 30 y 65 años: Prueba de Papanicolaou y HPV cada 5 años Es posible que las mujeres que se han sometido a una histerectomía o que sean mayores de 65 años de edad no necesiten la prueba de Papanicolaou.*
Prueba de detección de osteoporosis	Las mujeres con riesgo elevado de desarrollar osteoporosis deben hacerse esta prueba a partir de los 65 años.
Uso de la aspirina en dosis baja	Mujeres entre 50 y 59 años: consulten a su profesional médico sobre el consumo de aspirina en dosis bajas para prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal.
Consejería intensiva de salud mental	Todas las adolescentes sexualmente activas y las mujeres adultas que tienen un riesgo elevado de infecciones de transmisión sexual (STI, en inglés).
Recomendaciones para el hombre	
Prueba de detección de cáncer de próstata	Consulte a su profesional médico sobre las ventajas y los riesgos de hacerse la prueba.**
Aneurisma aórtico abdominal	Hombres entre 65 y 75 años: deben hacerse un ultrasonido si han fumado alguna vez.
Uso de la aspirina en dosis baja	Hombres entre 50 y 59 años: consulten a su profesional médico sobre el consumo de aspirina en dosis bajas para prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal.

¡Infórmese! Fuentes adicionales de información de salud:

- ahrq.gov/patients-consumers/prevention/index.html
- cancer.org/healthy/index
- cdc.gov/healthyliving/

Probablemente usted no duda en consultar a su profesional médico sobre la nutrición y el ejercicio y sobre cómo bajar peso o dejar de fumar. Otros temas de discusión podrían incluir:

- salud dental;
- problemas de alcoholismo o drogadicción;
- conducta sexual y enfermedades de transmisión sexual;
- sentimientos de depresión;
- violencia doméstica;
- prevención de accidentes/lesiones;
- prevención de caídas, especialmente para personas mayores de 65 años.

*Las recomendaciones podrían variar. Consulte a su profesional médico sobre las pruebas de prevención disponibles, especialmente si sus riesgos son mayores.

Las recomendaciones que se incluyen en la tabla se basan en información de organizaciones como el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés), American Academy of Family Physicians (academia estadounidense de médicos de familia), la Sociedad Americana contra el Cáncer y United States Preventive Services Task Force (grupo de trabajo sobre servicios preventivos de Estados Unidos). Las recomendaciones no pretenden sustituir el asesoramiento médico ni la opinión médica individual de un médico u otro profesional médico. Consulte a su profesional médico para obtener asesoramiento individualizado sobre las recomendaciones incluidas.

**La cobertura de servicios de atención médica preventiva sin gastos compartidos podría variar dependiendo de su cobertura médica y de la obtención de servicios mediante profesionales médicos de la red. Si tiene preguntas, llame al número de Servicio al Cliente en su tarjeta de asegurado.